



LOGO CENTRO	PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO Y LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19	PLAN /1COVID-19. FACULTAD DE FARMACIA
	Fecha del Documento	Pág. 75 de 76

Anexo XI. Protocolos para la gestión de incidencias e información



LOGO CENTRO	PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO Y LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19	PLAN /1COVID-19. FACULTAD DE FARMACIA
	Fecha del Documento	Pág. 76 de 76

¿Cuándo NO puedes acudir a la Facultad?

- Si eres un **caso confirmado** con infección activa (PCR o test antígenos positivo)
- Si presentas síntomas compatibles con COVID-19, **caso sospechoso**
- Si eres un **contacto estrecho** de caso confirmado

Tampoco debes acudir a la Facultad si:

- Si eres conviviente de una persona sintomática o de un contacto estrecho pendiente de confirmación por prueba (PCR o test antígenos)
- Si eres contacto estrecho de una persona sintomática o de un contacto estrecho pendiente de confirmación por prueba (PCR o test antígenos)
- Si vienes de una población con confinamiento perimetral te recomendamos no venir a la Facultad.

¿A quién dirigirme?

- La línea de información sobre el coronavirus (Andalucía): 900 40 00 61
- Universidad de Sevilla: covid19@us.es
- Facultad de Farmacia: farmacovid@us.es

¿Qué es un contacto estrecho?

- De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.
- El Servicio de Prevención de la US (SEPRUS), valorará los posibles contactos estrechos de los casos que hayan estado en la Facultad.
- Se valorarán los posibles contactos desde 2 días antes del inicio de los síntomas o de la prueba positiva (si asintomático)

¿Cuánto duran las cuarentenas por aislamiento preventivo?

- La duración recomendada por el Ministerio de Sanidad es de 10 días desde el contacto con el positivo

Siempre (dentro y fuera de la Facultad)

- Evita comportamientos de riesgo para la transmisión de la infección.
- Sigue las normas preventivas