

Sesión de Preparación de Olimpiada Matemática.

3 de Noviembre de 2017. Fernando Mayoral.
Desigualdades (y Polinomios y otras funciones) (I).

1.-Algunas desigualdades básicas.

1) $x^2 \geq 0$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$. La igualdad sólo se cumple para $x = 0$.

2) (Desigualdad triangular) Si $x, y \in \mathbb{R}$ entonces

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

La igualdad se cumple si, y sólo si, $xy \geq 0$.

3) Medias: aritmética (A), geométrica (G), armónica (H) y cuadrática (Q): Si $a, b > 0$,


$$A(a, b) = \frac{a+b}{2}, \quad G(a, b) = \sqrt{ab}, \quad H(a, b) = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}, \quad Q(a, b) = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.$$

Entonces

$$\boxed{\min\{a, b\} \leq H \leq G \leq A \leq Q \leq \max\{a, b\}}$$

y las igualdades se cumplen si y sólo si $a = b$.

Las desigualdades entre las medias tienen la visualización adjunta. Dicha visualización también muestra cuánto se parecen y cuánto se diferencian en función de lo parecidos o diferentes que sean a y b .



Cada una de las desigualdades involucradas en $H \leq G \leq A \leq Q$ son equivalentes entre sí y equivalentes a la desigualdad $(a-b)^2 \geq 0 \equiv 2ab \leq a^2 + b^2$ (y que la igualdad se cumple sólo, y exclusivamente, para $a = b$). También puede considerarse una interpretación geométrica en términos de áreas y perímetros de rectángulos.

- puesto que ab es el área de un rectángulo de lados a y b (perímetro = $2(a+b)$) y $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ es el área del cuadrado que tiene dicho perímetro (lado = $\frac{a+b}{2}$), la desigualdad

$$H \leq A \equiv \frac{2ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{2} \equiv ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2,$$

nos dice que el área del rectángulo es menor o igual que la del cuadrado del mismo perímetro. Y la igualdad sólo se obtiene en el caso del cuadrado $a = b$. Es decir, *de entre todos los rectángulos con un perímetro dado, el que tiene mayor área es el cuadrado.*

- Puesto que $2(a + b)$ es el perímetro de un rectángulo de lados a y b (área = ab) y el perímetro del cuadrado que tiene área ab (lado = \sqrt{ab}) es $4\sqrt{ab}$ la desigualdad

$$G \leq A \equiv \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \equiv 4\sqrt{ab} \leq 2(a+b),$$

nos dice que el perímetro del del rectángulo es menor o igual que la cuadrado del mismo área. Y la igualdad sólo se obtiene en el caso del cuadrado $a = b$. Es decir, *de entre todos los rectángulos con un área dada, el que tiene menor perímetro es el cuadrado.*

- 4) (Reordenamiento) Si $a \leq b$ y $x \leq y$, entonces $\boxed{ay + bx \leq ax + by.}$

Ejercicio 1.

- Demuestra la desigualdad triangular y que $|x - y| \geq ||x| - |y||$ para $x, y \in \mathbb{R}$.
- Demuestra la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica. Interpreta geoméricamente la desigualdad en términos de áreas. ¿Cuándo se verifica la igualdad?
- Demuestra e interpreta la desigualdad del reordenamiento.

Ejercicio 2. (Completando cuadrados) Demuestra las siguientes desigualdades:

- $x^2 + xy + y^2 \geq 0$.
- $x^2 - xy + y^2 \geq 0$.
- Si $x > 0$ entonces $x + \frac{1}{x} \geq 2$. Demuestra que la suma $x + y$ con $xy = 1, x > 0$, es mínima cuando $x = y = 1$. Interpreta geoméricamente el resultado.
- Si $0 < x < 2$ entonces $x(2 - x) \leq 1$. Demuestra que el producto xy con $x + y = 2, x, y > 0$, es máximo cuando $x = y = 1$. Intepreta geoméricamente el resultado.

Ejercicio 3. Demuestra las siguientes desigualdades:

- Si $0 \leq x \leq y \leq 1$ entonces $0 \leq xy^2 - x^2y \leq \frac{1}{4}$.
- Si $x, y > 0$ entonces $\sqrt{\frac{x^2}{y}} + \sqrt{\frac{y^2}{x}} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

Ejercicio 4. (OME-1984) Dados dos números reales positivos p, q tales que $p + q = 1$, y sabiendo que todo par de números reales x, y cumple $(x - y)^2 \geq 0$, se pide demostrar

- si $x, y > 0$, entonces $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$.
- $\frac{x^2 + y^2}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$.

c) si $p, q > 0$ y $p + q = 1$, entonces $\left(p + \frac{1}{p}\right)^2 + \left(q + \frac{1}{q}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$.

Ejercicio 5. (OME-1978) Se dan los números A_1, A_2, \dots, A_n . Demostrar, sin necesidad de calcular derivadas que el valor de X que hace mínima la suma

$$(X - A_1)^2 + \dots + (X - A_n)^2$$

es precisamente la media aritmética de los números dados.

2.- La desigualdad de Cauchy-Schwarz.

La desigualdad de Cauchy-Schwarz establece que para dos conjuntos de n números reales, a_1, a_2, \dots, a_n y b_1, b_2, \dots, b_n se verifica que

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + \dots + a_n^2) (b_1^2 + \dots + b_n^2).$$

La igualdad se cumple si y sólo si las n -uplas (a_1, a_2, \dots, a_n) y (b_1, b_2, \dots, b_n) son una múltiplo de la otra.

Podemos suponer que alguno de los $a_k \neq 0$. Puede demostrarse la desigualdad de Cauchy-Schwarz estudiando la gráfica del polinomio de segundo grado dado por

$$p(x) = \sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2.$$

Puesto que para todo $x \in \mathbb{R}$ se tiene

$$0 \leq p(x) = \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) x^2 + 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right) x + \sum_{k=1}^n b_k^2,$$

la gráfica/parábola $y = p(x) = Ax^2 + Bx + C$ está por encima del eje OX , o es tangente a él. Por tanto, el discriminante

$$\Delta = B^2 - 4AC \leq 0 \iff \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

El caso $B^2 = 4AC$, que se corresponde con que la parábola sea tangente a OX , es equivalente a que se verifique la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz y se da cuando $p(x_0) = 0$ para algún $x_0 \in \mathbb{R}$. Es decir, cuando existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$b_k = -x_0 a_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

o lo que es lo mismo (b_1, b_2, \dots, b_n) es un múltiplo de (a_1, a_2, \dots, a_n) .

Ejercicio 6. (OME-1971) Si $0 < p, 0 < q$ y $p + q < 1$, demostrar que $(px + qy)^2 \leq px^2 + qy^2$.

Ejercicio 7. Demostrar que si a, b, x, y son números reales y $a, b > 0$ entonces

$$\frac{(x+y)^2}{a+b} \leq \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b}.$$

Ejercicio 8. (OME, 1980) Demostrar que si a_1, a_2, \dots, a_n son números reales positivos, entonces

$$(a_1 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

¿Cuándo es válida la igualdad?

Ejercicio 9. Demuestra que

$$\frac{a^2}{2a^2 + bc} + \frac{b^2}{2b^2 + ca} + \frac{c^2}{2c^2 + ab} \leq 1$$

para todos los números reales positivos a, b, c .

Ejercicio 10. Deducir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz la **desigualdad entre la media aritmética y la media cuadrática**: Si a_1, a_2, \dots, a_n son números reales positivos se verifica que

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

Ejercicio 11. Dado un número natural $n \geq 2$ considere todos los números reales $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ tales que

$$x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 1.$$

Hallar el mayor valor posible y el menor valor posible de

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2.$$

Antes de considerar el caso general $n \geq 2$, considere el caso $n = 2$ dando una interpretación geométrica.

Sesión de Preparación de Olimpiada Matemática.

2 de Febrero de 2018. Fernando Mayoral.

Desigualdades (y Polinomios y otras funciones) (II).

3.- Desigualdades entre Medias.

Ya hemos considerado antes, e interpretado, las medias de dos números reales positivos. Dados n números reales positivos a_1, a_2, \dots, a_n suelen considerarse las siguientes medias:

- **Media aritmética.** $A = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$.

- **Media geométrica.** $G = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$.

- **Media armónica.** $H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}$.

- **Media cuadrática.** $Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}$.

La mismas desigualdades que vimos para las medias entre dos números se tienen en el caso de n números (reales positivos):

1) $\min_k \{a_k\} \leq H \leq G \leq A \leq Q \leq \max_k \{a_k\}$,

$$\min_k \{a_k\} \leq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}} \leq \max_k \{a_k\}.$$

2) Las igualdades se cumplen si y sólo si $a_1 = \dots = a_n$.

Ejercicio 12. (OME-1975) Probar que si el producto de n números reales y positivos es igual a 1, su suma es mayor o igual que n .

Ejercicio 13. Sean $x, y, z > 0$ tales que $x + y + z = 1$. Demuestra que $xy + yz + zx \leq \frac{1}{3}$. ¿Qué desigualdad se deduce sin la restricción $x + y + z = 1$?

4.- La desigualdad del reordenamiento.

A partir de la desigualdad del reordenamiento para dos sumandos, que ya hemos considerado, se puede justificar que si se tienen dos n -uplas ordenadas:

$$\begin{aligned} a_1 &\leq a_2 \leq \dots \leq a_n \\ b_1 &\leq b_2 \leq \dots \leq b_n \end{aligned}$$

entonces para cualquier permutación/reordenación (c_1, \dots, c_n) de (b_1, \dots, b_n) se tiene que

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n \geq a_1b_n + \dots + a_nb_1$$

Estas desigualdades se pueden interpretar en términos coloquiales de la siguiente forma: Se tienen billetes con distintos valores x_1, x_2, \dots, x_n y de cada tipo de billete se puede coger una cierta cantidad de entre cantidades prefijadas a_1, a_2, \dots, a_n . Si consideramos los valores ordenados de los billetes y de las cantidades, ¿Cuál es la forma de obtener la mayor cantidad posible cogiendo a_1 billetes de un tipo, a_2 billetes de otro tipo, y así sucesivamente hasta agotar las cantidades? El mayor valor total posible se obtendrá tomando el mayor número posible a_n de billetes con el mayor valor posible x_n , y con lo que vaya quedando ir haciendo lo mismo. El menor valor total posible se obtendrá tomando el mayor número posible de billetes lo más pequeños posible, y continuar con el mismo esquema hasta agotar las cantidades a tomar.

Ejercicio 14. Halla el mínimo de $\frac{\sin^3 x}{\cos x} + \frac{\cos^3 x}{\sin x}$ para $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Ejercicio 15. (IMO-1978)

Sean x_1, x_2, \dots, x_n números naturales distintos. Demuestra que

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Ejercicio 16.

Sean $a_k > 0, k = 1, \dots, n$ y $s = a_1 + \dots + a_n$. Probar que

$$\frac{a_1}{s - a_1} + \frac{a_2}{s - a_2} + \dots + \frac{a_n}{s - a_n} \geq \frac{n}{n - 1}.$$

Ejercicio 17. Sean x_1, x_2, \dots, x_{100} números reales no-negativos menores o iguales que 1. Halla el mayor valor posible de

$$x_1(1 - x_2) + x_2(1 - x_3) + \dots + x_{100}(1 - x_1)$$

Ejercicio 18. Desigualdad de Chebyshev, para medias.

Sean (a_1, a_2, \dots, a_n) y (b_1, b_2, \dots, b_n) dos conjuntos de n números reales. Demuestra que si están ordenados de la misma forma (ambos en forma creciente o ambos en forma decreciente), entonces

$$\frac{a_1b_n + \dots + a_nb_1}{n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{b_1 + \dots + b_n}{n} \leq \frac{a_1b_1 + \dots + a_nb_n}{n}.$$

.....

Son consecuencia casi directa de las desigualdades de reordenamiento. Para obtener la segunda desigualdad basta tener en cuenta que puesto que (a_1, a_2, \dots, a_n) y (b_1, b_2, \dots, b_n) están ordenados igual se tiene

$$\begin{aligned} a_1b_1 + \dots + a_nb_n &= a_1b_1 + \dots + a_nb_n \\ a_1b_1 + \dots + a_nb_n &\geq a_1b_2 + a_2b_3 + \dots + a_nb_1 \\ a_1b_1 + \dots + a_nb_n &\geq a_1b_3 + a_2b_4 + \dots + a_nb_2 \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \\ a_1b_1 + \dots + a_nb_n &\geq a_1b_n + a_2b_1 + \dots + a_nb_{n-1} \end{aligned}$$

Sumando estas desigualdades miembro a miembro se obtiene la segunda desigualdad del enunciado. La primera puede obtenerse de forma análoga.

Ejercicio 19. Sean a, b, c números reales positivos. Probar que $a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$.
